

原發性進行性失語症(PPA)

Primary Progressive Aphasia (PPA)

給病人與家屬的資訊

什麼是原發性進行性失語症？

原發性進行性失語症(PPA)是一種影響腦細胞的大腦疾病，它會引起病人語言方面的困難。

該疾病有哪些症狀？

原發性進行性失語症(PPA)病人通常有以下方面的困難：

- 說話時可能發音錯誤，口吃或在開始說話時有困難
- 說話時記著要使用的詞語
- 理解別人說什麼
- 閱讀和寫字

隨著病情越加惡化，原發性進行性失語症(PPA)病人會幾乎說不出話來。一段時間之後，原發性進行性失語症(PPA)也會導致記憶和/或行為的變化。這會使原發性進行性失語症(PPA)病人在照顧自己方面不再安全。



引起原發性進行性失語症(PPA)的原因是什麼？

我們尚不知道引起原發性進行性失語症(PPA)的原因，但我們知道有不好的蛋白質在大腦中沉積，情形類似於額顳葉型失智症或阿爾茨海默症。

目前，醫生只能在屍體解剖後（死亡後的屍體檢查）才可以確定原發性進行性失語症(PPA)的原因。但是，隨著醫生更多地瞭解此疾病的病徵和症狀，這種情形可能在未來有所改變。

有哪些治療方法？

目前尚無法治癒原發性進行性失語症(PPA)，但是，盡可能不斷練習講話技能會有幫助。

有關的安全是什麼？

由於原發性進行性失語症(PPA)影響病人的語言功能，它最終會使病人做以下事情時變得不安全：

- 閱讀（例如：藥品說明書、賬單、法律文書）
- 寫字（例如：開支票）
- 烹飪食物
- 駕駛車輛

如需更多健康資訊，請瀏覽UHN病人教育網站：www.uhnpatienteducation.ca

請聯繫我們提供反饋意見，或索取本手冊其他版本，例如大字體或電子版本：pfep@uhn.ca

© 2021 University Health Network. 版權所有。

本資料小冊子只供參考之用，原意並非用來代替專業的醫療意見，診斷或治療。如有特別病情，請向你的醫療護理服務提供者查詢。這些資料小冊子只可複印一份，作為私人非商業性用途。

表格：D-5427A | 作者：Dr. David Tang-Wai and Carmela Tartaglia | 編製：01/2021